

# **Furazolidona Forte**

## **Suspensión oral**

### **50 mg / 5 ml**

#### **Composición y presentación:**

Cada 5 ml de suspensión oral contiene:

Furazolidona 50,0 mg

Excipientes: Caolín, glicerol, metilparabeno, propilparabeno, goma xantano, celulosa microcristalina y carboximetilcelulosa sódica, sacarina sódica, propilenglicol, sodio hidróxido, polisorbato, esencia de damasco, agua purificada.

#### **Clasificación:**

Antiséptico intestinal.

#### **Indicaciones:**

Tratamiento de giardiasis, diarrea bacteriana y cólera producidos por microorganismos susceptibles a la furazolidona.

#### **Advertencias:**

Úsese sólo por indicación y bajo supervisión médica.

#### **Contraindicaciones:**

No usar en caso de hipersensibilidad a los nitrofuranos. No debe utilizarse en los niños menores de 1 mes y durante el embarazo. No administrar en conjunto con inhibidores de la monoaminoxidasa (I-MAO).

#### **Interacciones:**

Informe a su médico de todos los medicamentos que está usando, incluyendo aquellos que usted ha adquirido sin receta. Se han descrito interacciones con los siguientes productos: Alcohol, Efedrina, Antidepresivos Tricíclicos o I-MAO.

#### **Efectos indeseables:**

El uso de este medicamento puede producir los siguientes efectos que normalmente no requieren atención médica: Molestias gastrointestinales (dolor abdominal, diarrea, náuseas o vómitos), dolor de cabeza. Coloración amarillo oscuro a marrón de la orina.

#### **Reacciones adversas:**

Si usted presenta alguna de las siguientes reacciones adversas mientras esté en tratamiento con este producto, consulte a su médico: Reacciones de hipersensibilidad (rash cutáneo o enrojecimiento, picazón, fiebre, dolor articular), leucopenia (dolor de garganta y fiebre).

#### **Precauciones:**

Evitar los alimentos o bebidas que contienen tiramina: queso, cerveza, vino tinto y blanco, jerez, licores, habas, carne, ave o pescado ahumado, embutidos y frutas muy maduras. El uso simultáneo de furazolidona con estos productos, puede precipitar un alza de presión. Consultar al médico si no se produce mejoría en una semana.

#### **Dosis:**

El médico debe indicar la posología y el tiempo de tratamiento apropiado a su caso en particular, no obstante la dosis usual recomendada es:

- **Niños:** 5-8 mg/kg/día. Fraccionado en 3 o 4 tomas diarias.
- **Adultos:** 100 mg / dosis. Cada 6-8 horas.

**Modo de empleo:**

Agitar antes de usar. Administrar por vía oral con un vaso de agua o con alimentos, para reducir las molestias gástricas. Cumplir el ciclo completo del tratamiento. Si por olvido omite una dosis, tomarla lo antes posible, no tomarla si falta poco tiempo para la dosis siguiente.

**Sobredosis:**

No se han reportado casos; en caso de aparición de síntomas trasladar al paciente a un centro asistencial de urgencia para realizar un tratamiento sintomático y de mantención adecuado. Llevar este folleto de información.

**Condiciones de almacenamiento:**

Mantener en su envase original, fuera del alcance de los niños; protegido del calor. No use este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

No repita el tratamiento sin indicación médica.

No recomiende este medicamento a otra persona.