

TRIMETABOL[®]

COMPOSICIÓN

100 ml de la solución oral reconstituida contienen:

Ciproheptadina acefilinato (Metopina[®]) 35 mg

L-lisina HCl 5 g

DL-carnitina HCl 7,5 g

Tiamina HCl (vitamina B₁) 600 mg

Piridoxina HCl (vitamina B₆) 600 mg

Cianocobalamina (vitamina B₁₂) 20 mg

Excipientes: maltitol 40 g, sacarina sódica, parahidroxibenzoato de metilo, polividona K-30, esencia de fresa, manitol, agua purificada

FORMA FARMACÉUTICA Y CONTENIDO DEL ENVASE

Solución oral extemporánea. Se presenta en frasco conteniendo 150 ml de solución oral y sobre con 3 g de polvo oral.

ACTIVIDAD

Estimulantes del apetito.

TITULAR Y FABRICANTE

Titular:

J. URIACH & Cía, S.A.

Av. Camí Reial 51-57

08184 Palau-solità i Plegamans (Barcelona-España)

Fabricante:

ITALFARMACO, S.A.

San Rafael, 3

28108 - Alcobendas (España)

INDICACIONES

Estimulante del apetito y del desarrollo. Anabolizante fisiológico (no hormonal).

CONTRAINDICACIONES

No se han descrito.

PRECAUCIONES

No se han descrito.

INTERACCIONES

No se han descrito.

ADVERTENCIAS

Embarazo y lactancia

En el primer trimestre del embarazo TRIMETABOL sólo puede ser utilizado cuando el médico lo considere esencial para la salud de la paciente. Se desconoce si el fármaco se elimina por la leche materna, por lo que su administración en madres lactantes se realizará bajo estricto criterio médico.

Advertencia sobre excipientes

Este medicamento, por contener 40 g de maltitol por 100 ml de solución reconstituida como excipiente, puede causar diarreas.

POSOLOGÍA

Niños hasta 3 años: 2,5 ml tres veces al día.

Niños de 3 a 6 años: 5 ml tres veces al día

Niños mayores y adultos: 5-10 ml tres veces al día. Si el médico lo considera oportuno, las dosis citadas pueden modificarse dada la carencia de toxicidad del producto.

INSTRUCCIONES PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN DEL PREPARADO

Para preparar la solución verter el polvo en el frasco con líquido. Tapar y agitar.

La máxima eficacia del preparado se obtiene tomando el medicamento de media a una hora antes de las principales comidas.

TRIMETABOL puede tomarse, si lo desea, mezclado con cualquier otro líquido.

SOBRESOSIS

La intoxicación aguda con esta especialidad es rara dado su elevado índice terapéutico. En caso de intoxicación accidental, que sólo puede producirse por ingestión de dosis muy elevadas, se seguirán las pautas generales para favorecer la rápida eliminación de medicamentos (lavado de estómago, aumento de diuresis).

En caso de sobredosis o ingestión accidental, consultar al Servicio de Información Toxicológica. Teléfono 915.620.420.

REACCIONES ADVERSAS

Durante el tratamiento con TRIMETABOL, puede presentarse excepcionalmente una ligera somnolencia que, lejos de representar un inconveniente, resulta beneficiosa en niños nerviosos e intranquilos. Este efecto secundario puede eliminarse rebajando algo la dosis. Con todo, la sedación excesiva suele desaparecer espontáneamente a los tres cuatro días de tratamiento.

CONSERVACIÓN

Las condiciones de conservación son las normales.

CADUCIDAD

El tiempo de validez de la solución una vez preparada es de 1 mes, sin necesidad de guardarse en el frigorífico.

Este medicamento no se debe utilizar después de la fecha indicada en el envase.

CON RECETA MÉDICA

LOS MEDICAMENTOS DEBEN MANTENERSE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

TEXTO REVISADO: Febrero 2002

